Lesiones y Estados o Condiciones Cancerizables

Clasificación OMS 1978

- Lesiones cancerizables
  - Leucoplasia
  - Eritroplasia
- Estados o Condiciones cancerizables
  - Liquen plano oral
  - Lupus Eritematoso discoide crónico
  - Anemias ferropénicas(S. De Plummer Vinson)
  - Sífilis
  - Fibrosis oral submucosa

Clasificación Scully -1993

- Lesiones cancerizables
  - Leucoplasia
  - Eritroplasia
  - Liquen Plano Oral (Displasias Liquenoides)
  - Queilitis Actínica
  - Lupus Eritematoso discoide crónico
  - Agregado
    - Ülcera Traumática Crónica
    - Nevus Limítrofe y Compuesto
    - Candidiasis?

Scully- Cont.

- Estados o condiciones cancerizables
  - Anemias Ferropénicas (S. De Plummer Vinson)
  - Deficiencia de Vit.A
  - Sífilis
  - Fibrosis Oral Submucosa
  - Inmunodeficiencias
  - Disqueratosis Congénita
  - Xeroderma Pigmentoso
  - Cirrosis Hepática
  - Intoxicacion Arsenical

LIQUEN PLANO ORAL

- Definición
- Importancia-Epidemiología
  - Frecuencia,Variedad Clínica, Diag. Diferencial,Posible Relación con Enf. Malignas
  - 0´2 a 4 % población
  - 4 a 5 % -L. Estomatológicas
  - Más de 20% enf. Inf . No infecciosas.
  - Edad- 30 a 70 años
  - Sexo Femenino-2 o 3 a 1.
  - Raza- no.

Etiopatogenia

- Etiopatogenia
  - F. Predisponentes
  - Inicio- Desconocido
  - F. Responsables de las lesiones-F. Inmunológicos (Autoinmune?)- Interacción entre L.T sobre las cel. Epiteliales de la membrana basal- liquefaccion de la misma
  - F. Desencadenantes
  - Alt. Sistémicas asociadas y agravantes
  - F. locales

Clasificación-Clínica

- Clasificación Actual
  - Reticulares
  - Atrófico-Erosivo
  - Otras

- Clínica
  - Lesiones Extraorales- Piel y Otras Mucosas
  - Lesiones Bucales

Cancerización

- Reticulares NO
- Atrofico-Erosivas-Discutido
  - Malignización de la lesión en sí misma.
  - Por el adelgazamiento DEL Epitelio- facilitaría la acción de Agentes Cancerígenos
  - Papel de las Displasias Liquenodes
    - Mas común en lengua, Despues de los 50 años, Sexo Femenino,contaminado con Cándidas.

Tratamiento

- Información al paciente y Evaluación DEL Estado General y de los F. Locales. Y su Control.
- Formas Reticulares asintomáticas- Control period.
- Formas Atrófico-Erosivas- sintomáticas
  - Con trol de Candidas- Biopsia
  - Tratamiento medicamentoso CORTICOIDES .
    - Corticoterapia Tópica (pomadas o Enjuagatorios)Revaluar en 2 semanas
    - Corticoides intralesionales
    - Corticoides Sistémicos- SOLO en Exacerbaciones Agudas
    - RETINOIDES- Solo en líquenes queratósicos
    - OTRAS MEDICACIONES. Levamisol, Ciclosporina
- UVA
- CIRUJÍA –Convencional o Laser- Solo en displásicos o displasias Liquenoides. No es de elección.

Corticoides Tópicos

- Pomadas
  - Acetonida de Triamcinolona- 0,1 a 0,3 %
    Orabase 10 g.

  Clobetasol 0,025 % en orabase
- Enjuagatorios
  - Disolver una Capsula de Prednisona de 20 mg.en 10 cm3 de agua.
  - 3 veces por día.

Queilitis actínica,solar, estival

- Daño en los labios,sobre todo inf. En personas expuestas cronicamente al sol,cuya manif. Más frecuente es una descamación continua y seca.
- Más en hombres, rubios de tez clara.
- Clinica-Engrosamiento,Queratinización, aveces fisuras, vesículo-ampollas, luego costras. Pérdida DEL límite cutáneo-mucoso.
- Cancerización-es bien conocida-Hombres más de 50 años.
- Trat.Proctectores o Filtros solares:a)absorben quimicamente la radiación b) Reflectores físicos solares c)corticoides
- Cirujía- Bermellectomía previa biopsia,si h ay displasia moderada o grave o casos muy avanzados (conv. O laser).

Lupus Eritematoso discoide crónico

- Enf. Autoinmune DEL Tej. Conjuntivo, con lesiones en piel y mucosas.
- Malignización 0,1 a 4,2% en bermellón de labio,cuero cabelludo y piel de nariz.
- No se ha constatado malignización en mucosa bucal.

Ulcera traumática crónica
Nevus limítrofe y compuesto

- Ulcera T. Crónica
  - Lengua (sector medio y posterior de bordes,cara ventral),mejillas, labios.
  - Practicamente indolora
  - Trat.- Eliminar causa, si en 8 días no regresa, efectuar biopsia.
  - OJO¡ si hay mucha induracion en los bordes o en la base.(carcinoma epidermoide)

- Nevus Limítrofe y comp.
  - Lesión plana o elevada pigmentada, melánica generalmente aislada
  - Si se ulceró o sangra pude haber malignización.
  - Puede transformarse en melanoma maligno.
  - Prevención- Extirpación quirúrgica total con margen de seguridad y est. Anátomo-patológico pues en la boca puede traumatizarse facilmente.

Estados Cancerizables

Anemias ferropénicas S. De Plummer Vinson

- Anemia hipocrómica y microcítica
- El FE es necesario para la conformación normal de los epitelios.
- Su carencia produce atrofia e mucosa sobre todo lingual con depapilacio´n, lengua lisa, roja, dolorosa. Queilitis angulares
- S. De Plummer Vinson (Disf. Sideropénica)
- La atrofia favorece la acción de agentes cancerígenos que pueden llevar a carcinomas.

Deficiencia de Vit. A
Sífilis

- Def. de vitamina A
  - Rol en la diferenciación epitelial.Su carencia lleva a hiperqueratinización favoreciendo la aparición de leucoplasias.
  - Rol protector
  - Influye en la expresión genética
  - La sobrevida a un tumor depende de adecuados niveles de Vit. A.

- Sífilis Glositis Sifilítica
  - Manif. DEL período terciario. Rara, hoy.
  - Es atrófica por transtornos nutritivos de las papilas por vasculitis y fibrosis que lleva a depapilamiento
  - Lengua lisa ,brillante, luego esclerosis. Induracón y rigidez.
  - Leucoplasia(8%) y carcinomas(11%)
  - Papel de terapia arsenical en otros tiempos.

Fibrosis Oral submucosa Disqueratosis congénita

- Fibrosis oral submucosa
  - Proceso crónico producido por masticacion de tabaco y nuez de .betel(IndiaSE Asia)
  - Sens. Urente,Luego Vesículas y luego blanqueamiento por prolif. De colágeno y finalmente, rigidez.
  - Con irritantes lleva a leucoplasias y carcinoma epiderm. 6 a 8 veces más.

- Disqueratosis Congénita
  - Herditaria recesiva,solo en hombres.TRIADA
  - Atrofia y pigmentación de piel
  - Distrofia de uñas
  - Leucoplasias bucales y zonas eritroplásicas en lengua
  - Signos generales
  - Sobre las leucoplasias se pueden instalar carcinomas.

Inmunodeficiencias
Cirrosis Hepática.

- Inmunodeficiencias
  - S.I.D.A
  - Transplantados
  - Otras Inmunodef.
  - Favorece la instalación de :
  - Leucemias Linfocíticas
  - Linfomas No Hodgkin
  - Sarcoma de Kaposi

- Cirrosis hepática
  - Síntomas Generales
  - Alt. En piel,uñas, pelo
  - Alt. De coagulacion
  - BOCA-Atrofia de papilas linguales, lisa,
  - Labios barnizados
  - La atrofia favorece la acción de cancerígenos
  - Leucoplasias.

Xeroderma pigmentoso Intoxicación arsenical

- Xeroderma Pigment.
  - Genético-En hijos de parientes consanguíneo
  - En la infancia en areas expuestas al sol
  - Boca-Queilitis crónicas
  - Queratosis actínicas
  - Desarrollan en piel y labios, Carcinomas y melanomas.

- Intoxic. Arsenical
- En zonas donde hay niveles altos de AS en agua de consumo, se comprobó mayor incidencia de cancer, sobre todo en niños.